



١ عین حمراء



٢ عین متقيحة

إِنتِهَابُ بَاطِنِ الْجَفْنِ

أعراض المرض

يبدأ إلتهاّب باطن الجفّن غالبًا في جانب واحد. تتمثل الأعراض في زيادة التروية الدموية ومن ثم احمرار باطن الجفّن ١، وتورم باطن الجفّن، وزيادة التدميع، وحكة، والإحساس بأجسام غريبة في العين، وحرقان وآلام شديدة بعض الشيء. علاوة على ذلك يمكن أن يتكون قبح ٢ في العين. يمكن أن يظل موجودًا لما يصل إلى ٤ أسابيع. ويتسبب في حدوث مضاعفات أخرى بالعين. ولكنها غالبًا ما تُشفى دون أية عواقب.

التصريح بالعودة

الحالات المصابة بإلتهاّب باطن الجفّن يجب عليهم الاتصال بمكتب الصحة لمناقشة الإجراءات اللازمة. يختص طبيب العيون المعالج بقرار التصريح بالذهاب إلى حضانة الرعاية اليومية للأطفال كيتا.

طرق الإصابة

العدوى المنقولة بالرذاذ: السعال، العطس. عدوى منقولة عبر الاحتكاك: من خلال تلامس اليد والعين، لا سيما في حالة حكة إلتهاّب باطن الجفّن.

الوقاية

أهم إجراء نظافة صحية: النظافة الصحية للأيدي! إجراء له الأولوية بالنسبة لجميع أشخاص المنشأة المجتمعية!

يلزم غسل الأيدي جيدًا بالصابون من موزع الصابون ثم تجفيف الأيدي باستخدام مناشف اليد أحادية الاستخدام بعد كل ملامسة للعين. يجب ألا يذهب الأشخاص المصابون إلى المنشأة المجتمعية نظرًا لارتفاع خطر نقل العدوى.

فترة حضانة المرض

المدة من الإصابة بالعدوى حتى بداية ظهور المرض تستغرق حوالي ٢ حتى ١٠ يومًا.



المزيد من المعلومات على:

