



1 Occhi rossi



2 Pus dall'occhio

CONGIUNTIVITE

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: colpi di tosse, starnuti.

Infezione da contatto: tramite il contatto con occhi e mani, in particolare in caso di prurito.

PREVENZIONE

Misura igienica fondamentale: **igiene delle mani! Soprattutto per tutte le persone della struttura della comunità!**

È necessario lavare bene le mani con sapone dall'erogatore e asciugarle con asciugamani monouso dopo ogni contatto con gli occhi.

Le persone malate non possono frequentare la struttura della comunità a causa dell'alto pericolo di contagio.

PERIODO DI INCUBAZIONE

Dal contagio fino alla comparsa dei sintomi della malattia decorrono circa 2 - 10 giorni.

QUADRO CLINICO

La congiuntivite inizia in genere unilateralmente.

I sintomi sono aumento dell'irrorazione sanguigna e quindi arrossamento della congiuntiva ❶, gonfiore della congiuntiva, lacrimazione accentuata, prurito, sensazione di corpo estraneo, bruciore e in parte dolore intenso. Inoltre può formarsi del pus ❷ nell'occhio.

Può durare fino a 4 settimane e generare altre complicanze a carico dell'occhio, che in genere si risolvono senza conseguenze.

RIAMMISSIONE

I casi di congiuntivite devono essere segnalati all'ufficio d'igiene per concordare le misure necessarie.

La riammissione alla scuola dell'infanzia è decisa dall'oculista curante.

**ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO**

