



1 Ochi roșu



2 Ochi supurant

CONJUNCTIVITĂ

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor nazo-faringiene: tuse, strănut spre altă persoană. Infecțare prin contact: prin contactul mână - ochi, în special în cazul pruritului provocat de conjunctivită.

PROFILAXIE

Cea mai importantă măsură de igienă: **igiena mâinilor! Prioritară pentru toate persoanele din instituția cu colectivitate!**

Este necesară spălarea temeinică a mâinilor cu săpun din dozator cu săpun lichid și uscarea mâinilor cu prosoape de unică folosință după fiecare contact cu ochii.

Ca urmare a pericolului mare de contaminare, nu este permis ca persoanele bolnave să frecventeze instituția cu colectivitate.

PERIOADA DE INCUBAȚIE

De la survenirea infecției și până la declanșarea bolii trec aproximativ 2 până la 10 zile.

TABLOUL CLINIC

Conjunctivita debutează de cele mai multe ori la un ochi.

Simptomele sunt amplificarea vascularizării și, astfel, înroșirea conjunctivei **1**, inflamarea conjunctivei, secreții lacrimale excesive, mâncărime, senzația de corp străin, senzația de arsuri și parțial, dureri puternice. Dincolo de acestea, se poate forma puroi în ochi **2**.

Boala poate persista până la 4 săptămâni și poate declanșa complicații suplimentare la ochi, care însă de cele mai multe ori se vindecă fără consecințe.

READMITEREA

Cazurile de conjunctivită trebuie raportate direcției de sănătate, pentru a se conveni măsurile necesare.

Medicul oftalmolog curant decide cu privire la permisiunea de frecvență a grădiniței cu orar prelungit.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:**

