


**1** Покрасневший  
глаз



**2** Гноящийся глаз

# КОНЬЮНКТИВИТ

## ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

Воздушно-капельная инфекция: кашель, чихание.  
Контактная инфекция: при контакте рук с глазами, особенно при зуде конъюнктивита.

## ПРОФИЛАКТИКА

Основная санитарно-гигиеническая мера: **гигиена рук! В первую очередь для всех в общественном учреждении!**  
Необходимо тщательно мыть руки с мылом из дозатора и вытирать руки одноразовыми полотенцами после каждого контакта с глазами.  
Из-за высокого риска заражения больным не разрешается посещать общественные учреждения.

## ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

От заражения до начала проявления заболевания проходит от 2 до 10 дней.

## КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

В большинстве случаев конъюнктивит начинается на одном глазу.  
Симптомы — усиление кровотока и, следовательно, покраснение конъюнктивы <sup>1</sup>, отек конъюнктивы, усиление слезотечения, зуд, ощущение присутствия инородного тела, жжение и иногда сильная боль. Кроме того, в глазу может появиться гной <sup>2</sup>.  
Он может сохраняться до 4-х недель и вызвать дальнейшие осложнения в глазу, но обычно проходит без последствий.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

О случаях конъюнктивита необходимо сообщать в здравотдел для обсуждения необходимых мер.  
Лечащий офтальмолог принимает решение о допуске к посещению детского сада.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ  
СПРАВОЧНИКА MSD:**

