



1 Kızarık göz



2 İltihaplı göz

GÖZ NEZLESİ

ENFEKSİYON YOLU

Damlacık enfeksiyonu: Yüze karşı öksürme ve hapşırma.

Temas yoluyla enfeksiyon: el-göz teması, özellikle göz nezlesi kaşıntısı olduğunda.

ÖNLENMESİ

En önemli hijyen önlemi: **El hijyeni! Sosyal tesislerdeki tüm kişiler için öncelikli olarak geçerlidir!**

Eller, her göz temasından sonra sıvı sabunluktaki sabun kullanılarak iyice yıkanmalı ve kağıt peçete ile kurulmalıdır. Hastalığın bulaşma riskinin yüksek olmasından dolayı hasta kişiler kreşe gitmemelidir.

KULUÇKA SÜRESİ

Hastalığın bulaşmasından meydana çıkmasına kadar yaklaşık 2 ila 10 gün geçer.

HASTALIK TABLOSU

Göz nezlesi genelde tek taraflı olarak başlar. Belirtileri ise hızlandırılmış kan dolaşımı ve böylece konjonktiva zarının kızarması **1**, şişmesi, göz yaşı salgılanmasında artış, kaşıntı, gözde yabancı bir cisim var gibi bir his, yanma ve kısmen ciddi ağrılardır. Bunun dışında gözde iltihap **2** da oluşabilir. Bu iltihap gözde 4 haftaya kadar kalabilir ve gözde, çoğu zaman başka sonuçlara yol açmayan komplikasyonlara neden olabilir.

KREŞE TEKRAR KABUL EDİLME

Gerekli önlemlerin belirlenmesi için göz nezlesi vakaları Sağlık Dairesi'ne (Gesundheitsamt) bildirilmelidir.

Çocuğun kreşe gidip gidemeyeceği konusunda tedaviyi üstlenen göz doktoru karar verir.

AYRINTILI BİLGİ
DÜNYAGÖZ HASTANESİ
SAYFASINDA:

