




1 Eruzione cutanea



2 Diffusione



3 Afte nel cavo orale

MALATTIA MANO-PIEDE-BOCCA

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: Trasmissione con tosse, starnuti, mentre si parla.
Infezione da contatto: trasmissione tramite oggetti contaminati, mani contaminate (i virus possono essere espulsi anche per settimane con le feci).

PREVENZIONE

Il rischio di infezione può essere limitato con una buona igiene delle mani.

TEMPO DI INCUBAZIONE

Il tempo dall'infezione alla comparsa dei sintomi della malattia va da 5 a 35 giorni.

QUADRO CLINICO

1-2 settimane dopo il contagio eruzione cutanea rossa ¹ con prurito ai palmi delle mani, sulle piante dei piedi, glutei, ginocchia e gomiti ², che in seguito si evolve in vescicole di colore bianco-grigio. Contemporaneamente compaiono vescicole nel cavo orale e/o piccole ulcere dolorose (afte) ³, eventualmente febbre leggera. Decorso innocuo e guarigione spontanea della malattia dopo 3-6 giorni.

CONTAGIOSITÀ

Il pericolo di contagiosità è nella prima settimana e raggiunge il punto massimo in particolare quando le vescicole non sono ancora aperte. Poiché i virus vengono espulsi per settimane tramite le feci, le persone infette possono essere contagiose per molto tempo. Molti adulti infetti non presentano alcun quadro patologico.

RIAMMISSIONE

È possibile riprendere a frequentare la scuola dell'infanzia solo dopo la completa guarigione.

**ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO**

