



١ سعال شديد



٣ حمى



٢ زكام

سعال ديكي

المضاعفات

مُهدد للحياة بالنسبة للأطفال الرضع الذين لم يتم تطعيمهم: حيث لا تظهر لديهم الصورة النمطية للسعال الديكي، بل إنهم يعانون من حالات توقف للتنفس!

القابلية للإصابة

تبدأ القابلية للإصابة بالفعل قبل أيام قليلة من ظهور الأعراض الأولى ويمكن أن تستمر حتى حوالي ٣ أسابيع بعد بدء السعال النمطي. إعطاء مضاد حيوي يمكن أن يُقصر مدة القابلية للإصابة إلى ٥ أيام.

التصريح بالعودة

يجوز معاودة الذهاب إلى حضانة الرعاية اليومية للأطفال كيتا في حالة عدم العلاج بمضاد حيوي على أقل تقدير بعد ٣ أسابيع من بدء الإصابة بالسعال النمطي، وفي حالة العلاج بمضاد حيوي على أقل تقدير بعد ٥ أيام. ويجب أن تقوم حضانة الرعاية اليومية للأطفال كيتا بإبلاغ مكتب الصحة على وجه السرعة بالحالات المرضية.

طرق الإصابة

العدوى المنقولة بالرذاذ: تنتقل العدوى عند السعال، والعطس، والحديث.
العدوى المنقولة عبر الاحتكاك: عن طريق الأيدي المتسخة.

الوقاية

التطعيم في أقرب وقت ممكن!
التطعيم الأول في عمر ٢ و ٣ و ٤ شهور وكذلك في عمر ١١-١٤ شهر.
جرعة تنشيطية في عمر ٥-٦ سنوات وبين ٩-١٧ سنة.

فترة حضانة المرض

المدة من الإصابة بالعدوى حتى بداية ظهور المرض تستغرق حوالي ٧ حتى ٢٠ يومًا.

أعراض المرض

المدة: عدة أسابيع حتى شهور.
أول مرحلة: في الأسبوع الأول أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا مثل الحمى الخفيفة ٣ والرُكام ٢ والسعال الخفيف.
ثاني مرحلة: ما يصل إلى ٦ أسابيع نوبات سعال ١ مع صوت صفير في التنفس وقيء.
ثالث مرحلة: ما يصل إلى ٦ أسابيع تخف حدة نوبات السعال.



المزيد من المعلومات على:

