



**1 starker Husten**



**2 Schnupfen**



**3 Fieber**

# KEUCHHUSTEN

## INFEKTIONSWEG

Tröpfcheninfektion: Übertragung beim Husten, Niesen, Sprechen.  
Schmierinfektion: Über verunreinigte Hände.

## VORBEUGUNG

**Impfung zum frühestmöglichen Termin!**  
Erstimpfung im Alter von 2, 3 und 4 Monaten sowie im Alter von 11–14 Monaten.  
Auffrischung im Alter von 5–6 Jahren und zwischen 9–17 Jahren.

## INKUBATIONSZEIT

Von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung vergehen etwa 7 bis 20 Tage.

## KRANKHEITSBILD

Dauer: mehrere Wochen bis Monate.  
1. Phase: In der ersten Woche grippe-ähnliche Symptome wie leichtes Fieber ③, Schnupfen ②, leichter Husten.  
2. Phase: bis zu 6 Wochen anfallartiger Husten ① mit pfeifendem Einatemgeräusch und Erbrechen.  
3. Phase: bis zu 6 Wochen Abklingen der Hustenanfälle.

## KOMPLIKATIONEN

**Lebensbedrohlich für nicht geimpfte Säuglinge: Sie zeigen nicht das typische Bild des Keuchhustens, sondern leiden unter Atemstillständen!**

## ANSTECKUNGSFÄHIGKEIT

Ansteckungsfähigkeit beginnt bereits wenige Tage vor Auftreten der ersten Symptome und kann bis ca. 3 Wochen nach Beginn des typischen Hustens andauern. Eine Antibiotikagabe kann die Ansteckungsfähigkeit auf 5 Tage verkürzen.

## WIEDERZULASSUNG

**Die Kita darf ohne antibiotische Behandlung frühestens 3 Wochen nach Beginn des typischen Hustens, mit antibiotischer Behandlung frühestens nach 5 Tagen, wieder besucht werden.**  
Das Gesundheitsamt ist unverzüglich durch die Kita über Krankheitsfälle zu informieren.

**WEITERE INFORMATIONEN  
AUF DER SEITE DES  
ROBERT KOCH-INSTITUTES:**

