



1 Tosse forte



2 Raffreddore



3 Febbre

PERTOSSE

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: trasmissione con tosse, starnuti, mentre si parla.

Infezione da contatto: tramite mani non pulite.

PREVENZIONE

Eeguire il vaccino prima possibile!

Primo vaccino all'età di 2, 3 e 4 mesi e all'età di 11–14 mesi.

Richiamo a 5–6 anni e tra i 9 e 17 anni di età.

PERIODO DI INCUBAZIONE

Dal contagio fino alla comparsa dei sintomi della malattia decorrono circa 7–20 giorni.

QUADRO CLINICO

Durata: da diverse settimane fino a mesi.

1° fase: nella prima settimana sintomi simil-influenzali come leggera febbre ③, starnuti ②, lieve tosse.

2° fase: fino a 6 settimane tosse parossistica ① con respiro sibilante e vomito.

3° fase: fino a 6 settimane attenuazione degli attacchi di tosse.

COMPLICAZIONI

Potenzialmente letale per neonati non vaccinati: non mostrano il quadro tipico della pertosse, ma soffrono di arresti respiratori!

CONTAGIOSITÀ

La contagiosità inizia già pochi giorni prima della comparsa dei primi sintomi e può durare fino a circa 3 settimane dall'inizio della tipica tosse. L'assunzione di antibiotici può ridurre il periodo di contagiosità a 5 giorni.

RIAMMISSIONE

È possibile riprendere a frequentare la scuola dell'infanzia senza trattamento con antibiotici non prima di 3 settimane dopo la comparsa della tipica tosse, con terapia antibiotica non prima di 5 giorni. L'ufficio d'igiene deve essere immediatamente informato tramite scuola dell'infanzia in merito ai casi.

**ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO**

