



**1 Tuse puternică**



**2 Guturai**



**3 Febră**

# TUSEA CONVULSIVĂ

## MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor nazo-faringiene: transmitere prin tuse, strănut, vorbit.

Infecare prin contact: prin intermediul mâinilor murdare.

## PROFILAXIE

**Vaccinare în cel mai scurt termen posibil!**

Prima vaccinare la vârstele de 2, 3 și 4 luni, precum și la vârsta de 11–14 luni.

Vaccin de reinunizare la vârsta de 5–6 ani și între 9–17 ani.

## PERIOADA DE INCUBAȚIE

De la survenirea infecției și până la declanșarea bolii trec aproximativ 7 până la 20 zile.

## TABLOUL CLINIC

Durata: mai multe săptămâni, până la câteva luni.

Prima fază: în prima săptămână apar simptome similare gripei ca febră ușoară **3**, guturai **2**, tuse ușoară.

A doua fază: până la 6 săptămâni există accese de tuse **1** cu sunete tip șuierături la inspirare și cu vărsături.

A treia fază: până la 6 săptămâni are loc dispariția acceselor de tuse.

## COMPLICAȚII

**Pericol de moarte pentru sugarii nevaccinați: aceștia nu prezintă simptomele tipice ale tusei convulsive, însă suferă de apnee!**

## INFECȚIOZITATE

Infecțiozitatea începe deja cu câteva zile înainte de apariția primelor simptome și poate dura pe o perioadă de cca. 3 săptămâni după debutul tusei tipice. Administrarea de antibiotice poate reduce infecțiozitatea la 5 zile.

## READMITEREA

Frecventarea din nou a grădiniței cu orar prelungit este permisă cel devreme la 3 săptămâni după debutul tusei tipice după debutul tusei tipice în cazul în care nu se administrează tratament cu antibiotice și cel devreme după 5 zile cu tratament cu antibiotice.

Direcția de sănătate trebuie informată imediat de către grădinița cu orar prelungit cu privire la cazurile de îmbolnăvire.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE  
PE PAGINA  
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:**

