



1 Сильный кашель



2 Насморк



3 Повышение температуры тела

КОКЛЮШ

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

Воздушно-капельная инфекция: передача при кашле, чихании, разговоре.

Контактная инфекция: через грязные руки.

ПРОФИЛАКТИКА

Вакцинация в кратчайшие сроки!

Первичная вакцинация в возрасте 2, 3 и 4 месяцев, а также в возрасте 11–14 месяцев.

Ревакцинация в возрасте 5–6 лет и между 9–17 годами.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

От заражения до начала проявления заболевания проходит от 7 до 20 дней.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Продолжительность: от нескольких недель до месяцев.

1-я фаза: в течение первой недели проявляются симптомы, подобные гриппу, такие как незначительное повышение температуры **3**, насморк **2**, легкий кашель.

2-я фаза: до 6 недель, наблюдается приступообразный кашель **1** с хрипами и рвотой.

3-я фаза: до 6 недель, наблюдается затухание приступов кашля.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Угроза для жизни непривитых младенцев: у них нет типичной картины коклюша, но они подвержены остановке дыхания!

ЗАРАЗНОСТЬ

Заразность начинается за несколько дней до появления первых симптомов и может продолжаться до 3-х недель после начала типичного кашля. Прием антибиотиков может сократить период заразности до 5 дней.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Детский сад разрешено посещать без лечения антибиотиками не ранее, чем через 3 недели после начала типичного кашля, а при лечении антибиотиками – не ранее, чем через 5 дней.

Руководитель детского сада должен немедленно проинформировать здравоохранение о случаях заболевания.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
СПРАВОЧНИКА MSD:**

