



1 Ciddi öksürük



2 Nezle



3 Ateş

BOĞMACA ÖKSÜRÜĞÜ

ENFEKSİYON YOLU

Damlacık enfeksiyonu: Öksürük, hapşırma, konuşma yoluyla bulaşabilir.
Temas yoluyla enfeksiyon: Kirli ellerden bulaşabilir.

ÖNLENMESİ

Mümkün olan en erken zamanda aşı yapılmalıdır!

İlk aşı 2, 3 ve 4 aylıkken ve 11–14 aylıkken yapılmalıdır. Aşı, 5–6 yaşlarında ve 9–17 yaşları arasında tazelenmelidir.

KULUÇKA SÜRESİ

Hastalığın bulaşmasından meydana çıkmasına kadar yaklaşık 7 ila 20 gün geçer.

HASTALIK TABLOSU

Süresi: birkaç hafta, hatta birkaç ay.
1. aşaması: İlk haftada hafif ateş ③, nezle ②, hafif öksürük gibi gribe benzer belirtiler.
2. aşaması: 6 haftaya kadar atak şeklinde öksürük ①, buna ıslık şeklinde nefes alma sesi ve kusma da eşlik eder.
3. aşaması: Öksürük ataklarının geçmesi 6 haftaya kadar sürebilir.

KOMPLİKASYONLAR

Aşı olmamış bebekler için hayati tehlike oluşturur. Zira bebekler, boğmaca öksürüğünün tipik hastalık tablosunu göstermez, bunun yerine solunum durması yaşarlar.

BULAŞICILIK

Hastalığın bulaşıcılığı, daha ilk belirtilerin ortaya çıkmasından birkaç gün önce başlar ve tipik öksürüğün başlamasından 3 hafta sonrasına kadar sürebilir. Antibiyotik kullanımı bulaşıcılık süresini 5 güne indirebilir.

KREŞE TEKRAR KABUL EDİLME

Çocuklar, antibiyotik tedavisi uygulanmadığında tipik öksürüğün başlamasından en erken 3 hafta sonra, antibiyotik tedavisi uygulandığında ise en erken 5 gün sonra tekrar kreşe başlayabilirler.
Kreş, hastalık vakalarını derhal Sağlık Dairesi'ne (Gesundheitsamt) bildirmelidir.

AYRINTILI BİLGİ T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINDA:

