



1

Diffusione



2

Lendini



3

Prurito

PIDOCCHI

CONTAGIO

Da persona a persona, in genere tramite contatto testa-testa, occasionalmente anche tramite oggetti entrati in contatto con il cuoio capelluto (ad es. copricapi, sciarpe, spazzole, peluche, ecc.)

SINTOMI

Parassiti di 2–3 mm sul cuoio capelluto del soggetto. Attraverso una piccola proboscide succhiano il sangue dal cuoio capelluto più volte al giorno, provocando forte **prurito** 3. Le piccole uova ovali dei parassiti, delle dimensioni di 0,8 mm, sono chiamate "**lendini**" 2 e aderiscono in prossimità dell'attaccatura dei capelli. Si può riconoscere particolarmente bene l'infestazione **dietro le orecchie, nell'area delle tempie e del collo** 1.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

In presenza di pediculosi non è possibile frequentare una struttura della comunità.

La pediculosi va comunicata subito alla direzione della struttura della comunità e in caso di infestazione da pidocchi nella scuola dell'infanzia i genitori devono controllare il cuoio capelluto dei loro figli. I genitori possono accertare la presenza di pidocchi autonomamente, procedere a un idoneo trattamento e confermarlo con una comunicazione scritta a parte.

TRATTAMENTO

Il trattamento avviene con farmaci. Con il trattamento si intende eliminare pulci e larve. È sempre necessario un secondo trattamento 8-10 giorni dopo il primo. La rimozione delle lendini avviene dopo il trattamento con il farmaco, pettinando accuratamente i capelli umidi con l'apposito pettine specifico.

ALTRI ACCORGIMENTI

- Pulire pettini, spazzole, fermagli o nastri per capelli con acqua calda e sapone con una spazzola fine.
- Lavare copricapi e biancheria da letto con un programma intensivo a una temperatura minima di 60°.
- I capi di abbigliamento e i peluche non lavabili vanno conservati per 3 giorni in un sacchetto di plastica chiuso o tenuti per 24 ore a -15°C nel freezer.
- Tutte le superfici con cui entrano in contatto i capelli vanno pulite con l'aspirapolvere.

RIAMMISSIONE

In caso di **prima infestazione** è consentita la riammissione alla scuola dell'infanzia se i genitori hanno eseguito un trattamento adeguato, fornendone dichiarazione scritta. In caso di **seconda infestazione** la riammissione presso la struttura della comunità è consentita solo con un certificato medico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO

