



1 Распространение



2 Гниды



3 Чесотка

ГОЛОВНЫЕ ВШИ

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

От человека к человеку, в основном через непосредственный контакт, иногда через предметы, которые соприкасались с волосами на голове (например, головной убор, шарфы, расчески, игрушки и т. д.).

СИМПТОМЫ

Паразиты величиной 2–3 мм на волосах головы человека. Используя свои ротовые аппараты, они сосут кровь из кожи головы несколько раз в день, что может привести к сильному зуду 3.

Маленькие овальные яйца вшей размером 0,8 мм называются «гнидами» 2 и крепятся у корня волос. Особенно хорошо такое поражение распознается в **областях за ушами, на висках и шее** 1.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

При поражении головной вошью **запрещается посещать общественные места**. О поражении головной вошью необходимо немедленно сообщить руководителю общественного учреждения. А если такой случай имел место в детском саду, то все родители должны проверить своих детей на наличие вшей. Родители могут самостоятельно обнаружить поражение, провести соответствующее лечение и подтвердить это в отдельном письменном уведомлении.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение проводится с помощью медикаментов. Оно направлено на уничтожение вшей и личинок. Через 8–10 дней после окончания первого курса лечения всегда необходимо проводить повторный курс.

После обработки препаратом гниды удаляются путем тщательного вычесывания влажных волос специальным гребнем.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ

- Вымыть расчески, щетки, заколки для волос или резинки для волос тонкой щеткой в горячей мыльной воде.
- Постирать головные уборы и постельное белье в воде при температуре не ниже 60°, не используя режим «быстрой стирки».
- Предметы одежды, которые нельзя постирать, и мягкие игрушки, хранить в течение 3-х дней в запечатанном пластиковом пакете или в морозильной камере в течение 24 часов при -15°C.
- Все поверхности, соприкасающиеся с волосами, пропылесосить.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В случае **первичного поражения** возможно возвращение в детский сад, если родители провели надлежащее лечение и есть письменное заявление о лечении.

В случае **повторного поражения** возвращение в общественное учреждение возможно только при наличии медицинской справки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
СПРАВОЧНИКА MSD:

