




١ حكة



٣ الانتشار



٢ سوس في الجلد

جرب

القابلية للإصابة

تظل إمكانية العدوى قائمة طالما لم يتم العلاج. يتم قتل عث الجرب من خلال غسل الملابس عند درجة حرارة ٦٠ درجة أو التنظيف الكيميائي أو تعبئة الملابس في أكياس بلاستيكية لمدة أسبوع واحد. قم بتنظيف المفروشات والأثاث والسجاد جيدًا بالمكنسة الكهربائية وتخلص على الفور من الكيس.

التصريح بالعودة

التصريح بالعودة بعد تلقي العلاج الطبي وهدوء حدة الأعراض. يجب إبلاغ إدارة حضانة الرعاية اليومية للأطفال كيتا بالمرض على وجه السرعة. وتقوم الإدارة بدورها بالإبلاغ الفوري عن المرض لدى مكتب الصحة. لتجنب استمرار انتشار المرض وحدوث انتكاسات، ينبغي كذلك توجيه الأشخاص المحتكين بالمرض إلى الطبيب المعالج. يلزم تقديم شهادة طبية كتابية!

مسبب المرض

مرض جلدي مُعدي ناتج عن عث الجرب. تضع إناث عث الجرب بيضها في الطبقة القرنية للجلد وتلتهم مسارات بطول حوالي ٢,٥ سم في الجلد وبشكل منفصل عن المضيف تبقى العث قابلة للحياة لمدة ٢-١ يومًا عند درجة حرارة ٢١ درجة.

طرق الإصابة

الإصابة بالعدوى من جراء التلامس الجسدي اللصيق (المداعبة، النوم في نفس السرير الاستخدام المشترك للمناشف).

فترة حضانة المرض

المدة من الإصابة بالعدوى حتى بداية ظهور المرض تستغرق حوالي ٤ - ٥ أسابيع.

أعراض المرض

حرقان خفيف بالجلد وحكة مختلفة الشدة ١. تزداد من خلال دفع السرير. نقاط حمراء صغيرة تشبه لدغات البعوض، والتي يمكن أن تلتهب من خلال حكها. معظم نطاقات الجلد الموجودة بين أصابع القدم والأصابع. وجهات ثني الكوعين والرسغين، ومناطق الكاحل، وحواف القدم الداخلية، والإبطين و/أو جميع مواضع الجلد الموجودة في نطاق الملابس الداخلية ٢. ٣.



المزيد من المعلومات على:

