



1

Prurit



2 Sarcoptul scabiei



3

Răspândire

SCABIA

AGENT PATOGEN

Este o boală infecțioasă a pielii provocată de sarcoptul scabiei. Sarcoptul femelă își depun ouăle în stratul cornos al pielii și sapă canale lungi de cca. 2,5 cm în epidermă **2**. În situația separării de gazdă, sarcoptii trăiesc 1-2 zile la o temperatură de 21 de grade.

MODUL DE INFECTARE

Contagiune prin contact corporal strâns (îmbrățișare, dormit în același pat, utilizarea în comun a prosoapelor).

PERIOADA DE INCUBAȚIE

De la contagiune și până la declanșarea bolii trec aproximativ 4-5 săptămâni.

TABLOUL CLINIC

Ușoare arsuri pe piele și prurit de diferite intensități **1**, amplificate de căldura patului. Puncte mici, roșii, similare înțepăturilor de țânțari, care se pot inflama prin scărpinat. De cele mai multe ori apare o infestare în zonele dintre degetele de la picioare și cele de la mâini, în regiunile de flexare a coa-telor și încheieturilor mâinilor, în regiunea gleznelor, pe marginile interioare aleabei piciorului, în zonele axilare și/sau în toate zonele de piele din regiunile lenjeriei de corp **3**.

INFECȚIOZITATE

Infecțiozitatea există atâta timp cât boala nu este tratată.

Distrugerea sarcoptilor prin spălarea ru-felor la 60 de grade, curățare chimică sau ambalarea lor în saci de plastic pentru 1 săptămână. Aspirați temeinic pernele, mobilierul, covoarele și eliminați imediat conținutul sacilor.

READMITEREA

Readmiterea în colectivitate este posibilă după tratamentul medical și dispariția simptomelor. Boala trebuie raportată imediat conducerii grădiniței cu program prelungit. Informare neîntârziată a direcției sanitare de către conducere.

În vederea prevenirii unei răspândiri în continuare și a recidivelor, este bine ca și persoanele de contact să se prezinte la medicul curant.

Este necesar un certificat medical în scris!

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:**

