



1 Kaşıntı



2 Deri içinde parazit



3 Yayılma şekli

UYUZ

HASTALIK NEDENİ

Uyuz parazitinin neden olduđu bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Dişî parazitler, yumurtalarını derinin karniye tabakasına bırakır ve deriyi yiyerek deride yaklaşık 2,5 cm uzunluğunda yollar açar 2 . Parazitler taşıyıcıdan ayrıldığında 1–2 gün boyunca 21 derece sıcaklıkta yaşayabilir.

ENFEKSİYON YOLU

Yakın vücut teması (kucaklaşma, aynı yatakta uyuma, havluları ortak kullanma) sonucunda bulaşabilir.

KULUÇKA SÜRESİ

Hastalığın bulaşmasından meydana çıkmasına kadar yaklaşık 4–5 hafta geçer.

HASTALIK TABLOSU

Deride hafif yanma ve kişiden kişiye değışen kaşıntı 1 . Bu kaşıntı yatağın sıcaklığı ile artabilir.

Sivrisinek sokmasına benzeyen ve kaşıma sonucunda iltihap toplayabilen küçük, kırmızı noktalar.

Genelde ayak ve el parmaklarının arasındaki deri bölge, dirseklerin bükülen tarafı ve el bilekleri, parmak eklem bölgeleri, ayakların iç kenarları, koltuk altları ve/veya iç çamaşır bölgesi istila edilir 3 .

BULAŞICILIK

Hastalık tedavi edilmediği sürece bulaşıcıdır. Çamaşırılar 60 derecede yıkanarak, kimyasal temizlemeye tabi tutularak veya 1 haftalığına plastik torbalara konularak parazitler öldürülebilir.

Döşemeler, mobilyalar ve halıları iyice süpürün ve toz torbasını derhal atın.

KREŞE TEKRAR KABUL EDİLME

Çocuklar doktor tedavisi ve belirtilerin kaybolmasından sonra kreşe tekrar kabul edilebilir. Uyuz vakaları derhal kreş yönetimine bildirilmelidir. Yönetim ise derhal Sağlık Dairesi'ni (Gesundheitsamt) haberdar eder.

Hastalığın daha da yayılması ve nüksetmesinin önlenmesi için hasta kişiler ile temas eden kişiler de tedaviyi sürdüren doktora görünmelidir.

Yazılı bir doktor onayı gereklidir!

AYRINTILI BİLGİ DERİ VE
ZÜHREVİ HASTALIKLAR
DERNEĞİ SAYFASINDA:

