



١ حمى



٣ قيء



٢ آلام البطن

التهاب معدى معوي

أعراض المرض

قيء متدفق ٣ وإسهال مائي وتقلصات البطن ٢.
في بداية ظهور المرض تظهر في كثير من الأحيان
أعراض نزلة البرد وحمى متوسطة ١.
وتخف حدة الأعراض مرة أخرى بعد ١٢ حتى ٤٨
ساعة في معظم الحالات.

المضاعفات

مع الأطفال الرضع والأطفال الصغار يكون هناك
خطر الجفاف من جراء فقدان السوائل (الجفاف)

التصريح بالعودة

يمكن الذهاب إلى حضانة الرعاية اليومية
للأطفال كيتا مرة أخرى بعد ٤٨ ساعة من هدوء
حدة الأعراض. هذا يعني: مرور ٤٨ ساعة بعد أن
يتوقف القيء لدى الطفل المصاب ويتوقف كذلك
الإسهال وتزول الحمى وتستقر دورته الدموية ولم
يعد بحاجة إلى اتباع حمية غذائية صارمة.

طرق الإصابة

عدوى احتكاك برازية فموية: تنتقل العدوى عن
طريق الأشياء المتسخة أو محتوى القيء أو تناول
المواد الغذائية الملوثة.

الوقاية

أهم إجراء وقائي: النظافة الصحية لليدي!

فترة حضانة المرض

المدة من الإصابة بالعدوى حتى بداية ظهور
المرض تمتد من ٦ إلى ٥٠ ساعة.



المزيد من المعلومات على:

