



1

Febră



2 Dureri abdominale



3

Vărsături

GASTROENTERITA

MODUL DE INFECTARE

Infecție prin contact, pe cale fecal-orală: transmitere prin obiecte murdare, vomă sau prin consumul unor alimente contaminate.

PROFILAXIE

Cea mai importantă măsură preventivă: **igiena mâinilor!**

PERIOADA DE INCUBAȚIE

Perioada de la survenirea infecției și până la declanșarea bolii este de 6 până la 50 de ore.

TABLOUL CLINIC

Vărsături tip „proiectil” **3**, adică în jeturi, diaree apoasă și crampe abdominale **2**. La debutul bolii, apar frecvent simptome de răceală și febră moderată **1**. Simptomele dispar de cele mai multe ori după 12 până la 48 de ore.

COMPLICAȚII

În cazul sugarilor și copiilor mici, există pericol de deshidratare ca urmare a pierderii de lichide

READMITEREA

Este permisă frecventarea din nou a grădiniței cu orar prelungit la 48 de ore după dispariția simptomelor. Aceasta înseamnă: la 48 de ore după ce copilul bolnav nu mai vomită, nu mai are diaree, nu are febră, este stabil hemodinamic și nu mai necesită regim alimentar strict.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:**

