



1 Повышение
температуры тела



2 Боли в области
живота



3 Рвота

ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

Фекально-оральный путь передачи инфекции: передача через загрязненные предметы, рвоту или употребление загрязненных продуктов.

ПРОФИЛАКТИКА

Основная профилактическая мера:
Гигиена рук!

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

От заражения до начала проявления заболевания проходит от 6 до 50 часов.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Фонтанирующая рвота **3**, водянистая диарея и спазмы желудка **2**.
В начале заболевания проявляются симптомы простуды и умеренное повышение температуры **1**.
Симптомы обычно проходят через 12–48 часов.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Опасность обезвоживания из-за потери жидкости (дегидратации) у младенцев и детей младшего возраста

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Детский сад можно снова посещать через 48 часов после устранения симптомов.
Это значит: через 48 часов после того, как у больного ребенка больше нет рвоты, диареи, повышенной температуры, гемодинамические показатели в норме и он больше не нуждается в строгой диете.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
КОЛОБОК:**

