



1

Ateş



2

Karın ağrısı



3

Kusma

# MİDE-BAĞIRSAK HASTALIĞI

## ENFEKSİYON YOLU

Dışkı-ağız yoluyla bulaşan enfeksiyon: Kirli nesnelere ve kusmuk ile temas veya virüslü gıda maddelerinin tüketimi sonucunda bulaşabilir.

## ÖNLENMESİ

Hastalığı önleyici en önemli önlem:  
**El hijyeni!**

## KULUÇKA SÜRESİ

Hastalığın bulaşmasından ortaya çıkmasına kadar geçen süre 6 ila 50 saattir.

## HASTALIK TABLOSU

Fıskırır tarzda kusma **3**, sulu ishal ve karın krampları **2**.

Hastalığın başlangıcında sıkça soğuk algınlığı belirtileri ve orta dereceli ateş **1** meydana gelir.

Belirtiler, çoğu zaman 12 ila 48 saat sonra tekrar kaybolur.

## KOMPLİKASYONLAR

Bebek ve küçük çocuklarda sıvı kaybı sonucunda vücut susuz kalabilir.

## KREŞE TEKRAR KABUL EDİLME

**Çocuklar belirtilerin kaybolmasından 48 saat sonra tekrar kreşe kabul edilebilir.**

Başka bir deyişle: Çocuğun kusmasının, ishalinin, ateşinin bitmesi ve kan dolaşımının normale girmesinden ve artık sıkı bir diyet gerektirmemesinden 48 saat sonra.

**AYRINTILI BİLGİ MEDİKAL  
AKADEMİ SAYFASINDA:**

