



١ حمى

١



٢ تورم الخد

٢

نكاف

المضاعفات

يمكن إصابة جميع غدد الجسم. لدى المراهقين والبالغين الذكور يمكن أن يصيب فيروس النكاف الخصيتين ويتسبب في الإصابة بالعقم.

القابلية للإصابة

الخطر الأكبر للإصابة بالعدوى: يومان قبل بدء الأعراض حتى ٤ أيام بعد بدء الأعراض. لكنها يمكن أن تستمر حتى ٩ أيام.

التصريح بالعودة

يمكن التصريح بالعودة إلى حضانة الرعاية اليومية للأطفال كيتا على أقل تقدير بعد ٩ أيام من بدء ظهور المرض.

ولا يجوز للأشخاص المحتمكين بالمرض الذهاب إلى حضانة الرعاية اليومية للأطفال كيتا لمدة ١٨ يومًا. ولا يسري ذلك في حالة ثبوت تعرضهم بالفعل لإصابة سابقة بالنكاف أو إذا تم تطعيمهم ضده.

طرق الإصابة

العدوى المنقولة بالرذاذ: تنتقل العدوى عند التحدث والعطس والسعال. بل وأيضا عن طريق الأشياء الملوثة باللعاب.

الوقاية

التطعيم (غالبًا كتطعيم مُركب مع الحصبة والحصبة الألمانية وجدري الماء) بين عمر ١١ و ١٤ شهر. ويمكن إعطاء التطعيم الثاني بعد ذلك بالفعل بمقدار ٤-٦ أسابيع.

فترة حضانة المرض

المدة من الإصابة بالعدوى حتى بداية ظهور المرض تستغرق حوالي ١٢ حتى ٢٥ يومًا.

أعراض المرض

المدة: ٣-٨ أيام
آلام حمى ١. وصداع ومغص. فقدان الشهية. القيء (يتأثر البنكرياس). تورم نمطي للغدة النكفية ٢. غالبًا يكون أحادي الجانب في البداية (خد سميك، جحوظ شحمة الأذن).



المزيد من المعلومات على:

