



1

Febbre



2

**Gonfiore delle
guance**

ORECCHIONI

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: trasmissione tramite saliva mentre si parla, starnuti, tosse ma anche attraverso oggetti contaminati con la saliva.

PREVENZIONE

Vaccino (in genere vaccino combinato con morbillo, rosolia e varicella) tra l'11° e il 14° mese di vita, il richiamo può essere eseguito già dopo 4–6 settimane.

PERIODO DI INCUBAZIONE

Dal contagio fino alla comparsa dei sintomi della malattia decorrono circa 12–25 giorni.

QUADRO CLINICO

Durata: 3–8 giorni

Febbre **1**, mal di testa e mal di pancia, perdita di appetito, vomito (coinvolgimento del pancreas), tipico gonfiore della parotide **2**, spesso inizialmente solo su un lato (guance gonfie, lobi delle orecchie sporgenti).

COMPLICAZIONI

Possibile coinvolgimento di tutte le ghiandole del corpo.

Nei giovani e negli uomini adulti il virus degli orecchioni può colpire i testicoli e causare infertilità.

CONTAGIOSITÀ

Massimo pericolo di contagio: da 2 giorni a 4 giorni dopo la comparsa. Può persistere però fino a 9 giorni.

RIAMMISSIONE

La riammissione alla scuola dell'infanzia è possibile non prima di 9 giorni dalla comparsa della patologia.

I soggetti a contatto non possono frequentare la scuola dell'infanzia per un periodo di 18 giorni.

Tale limitazione non si applica se essi hanno già contratto gli orecchioni prima in modo documentabile o sono stati vaccinati.

**ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO**

