



1

Febră



2

Inflamarea zonei
mandibulare

PAROTIDITA EPIDE- MICĂ/OREIONUL

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor nazo-faringiene: transmitere prin vorbit, strănut, tuse, însă și prin intermediul unor obiecte contaminate cu salivă.

PROFILAXIE

Vaccinare (de cele mai multe ori, ser de vaccin combinat pentru rujeolă, rubeolă și vărsat de vânt) între a 11-a și a 14-a lună de viață, a doua vaccinare se poate efectua deja 4-6 săptămâni mai târziu.

PERIOADA DE INCUBAȚIE

De la survenirea infectării și până la declanșarea bolii trec aproximativ 12 până la 25 zile.

TABLOUL CLINIC

Durata: 3-8 zile
Febră ¹, cefalee și dureri abdominale, lipsa poftei de mâncare, vărsături (este afectat pancreasul), inflamare tipică a glandei parotide ², adesea debutează unilateral (umflarea obrazului, lobul urechii depărtat de cap).

COMPLICAȚII

Este posibilă afectarea tuturor glandelor corpului. În cazul tinerilor și al bărbaților adulți, virusul de oreion poate afecta testiculele și poate provoca infertilitate. În cazul tinerilor și al bărbaților adulți, virusul de oreion poate afecta testiculele și poate provoca infertilitate.

INFECȚIOZITATE

Pericol ridicat de contagiune: cu 2 zile înainte până la 4 zile după debutul fenomenelor. Poate dura însă până la 9 zile.

READMITEREA

O readmitere în grădinița cu orar prelungit este posibilă cel devreme la 9 zile după declanșarea bolii.

Persoanele de contact nu au voie să frecventeze grădinița cu orar prelungit pentru un interval de timp de 18 zile. Această interdicție nu se aplică dacă pot demonstra că au avut deja de oreion sau că au fost vaccinate.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:**

