



**1** Повышение  
температуры тела



**2** Отек щёк

# СВИНКА

## ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

Воздушно-капельная инфекция: передача при кашле, чихании, разговоре, а также через предметы, на которых есть следы слюны.

## ПРОФИЛАКТИКА

Вакцинация (обычно в виде комбинированной вакцины против кори, краснухи и ветряной оспы) между 11-м и 14-м месяцами жизни, вторая вакцинация может быть сделана уже через 4–6 недель.

## ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

От заражения до начала проявления заболевания проходит от 12 до 25 дней.

## КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Продолжительность: 3–8 дней  
Лихорадка <sup>1</sup>, головная боль и боли в области живота,  
потеря аппетита, рвота (поражение поджелудочной железы), типичный отек околушной железы <sup>2</sup>, часто только односторонний (отек щеки, выступающая мочка уха).

## ОСЛОЖНЕНИЯ

Возможно заражение всех желез организма. У подростков и взрослых мужчин вирус паротита может инфицировать яички и стать причиной бесплодия.

## ЗАРАЗНОСТЬ

Наибольший риск заражения: в период, который начинается за 2 дня до и оканчивается через 4 дня после начала проявления симптомов.  
Но может длиться до 9 дней.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Возвращение в детский сад разрешается не ранее, чем через 9 дней после начала заболевания.

Тем, у кого был контакт с больным не разрешается посещать детский сад в течение 18 дней. Но в этом нет необходимости, если у них ранее была диагностирована свинка или они были привиты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ  
СПРАВОЧНИКА MSD:

