



1

Ateş



2

Yanaklarda
şişkinlik

KABAKULAK

ENFEKSİYON YOLU

Damlacık enfeksiyonu: Konuşma, hapşırma, öksürme ve tükürük bulaşan nesnelere yoluyla yayılır.

ÖNLENMESİ

11. ila 14. ay arasında aşı (genelde kızamık, kızamıkçık ve suçiçeği ile birlikte kombine aşı maddesi olarak), ikinci aşı ilkinden hemen 4-6 hafta sonrasında yapılabilir.

KULUÇKA SÜRESİ

Hastalığın bulaşmasından meydana çıkmasına kadar yaklaşık 12 ila 25 gün geçer.

HASTALIK TABLOSU

Süresi: 3-8 gün

Ateş ①, baş ve karın ağrısı, iştahsızlık, kusma (pankreas etkilendiğinde), tipik kulak altı bezi şişmesi ②, genelde başlarda tek tarafta (yanaklar şiş, kulak memeleri kalkık olur).

KOMPLİKASYONLAR

Vücuttaki tüm salgı bezlerine bulaşabilir. Kabakulak virüsü, gençlerde ve yetişkin erkeklerde testisleri istila ederek kısırlığa neden olabilir.

BULAŞICILIK

Bulaşma riskinin en yüksek olduğu dönem: Hastalığın ortaya çıkmasından 2 gün öncesinden 4 gün sonrasına kadar. Bu süre 9 güne kadar da uzayabilir.

KREŞE TEKRAR KABUL EDİLME

Çocuklar en erken hastalığın ortaya çıkmasından itibaren 9 gün sonrasında kreşe tekrar kabul edilebilir. Hastalar ile temas etmiş olan kişiler 18 gün boyunca kreşe gidemez. Bu durum, kişilerin daha önce kabakulak geçirdiklerini kanıtlamaları ya da aşı olmaları durumunda geçerli değildir.

**AYRINTILI BİLGİ T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINDA:**

