



1 Mal di gola



2 Raffreddore



3 Febbre

MONONUCLEOSI INFETTIVA

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: Trasmissione con colpi di tosse, starnuti, mentre si parla (chiamata anche "malattia del bacio" in quanto la trasmissione avviene spesso da bocca a bocca).

Infezione da contatto: attraverso oggetti o mani contaminate.

PREVENZIONE

Norme igieniche generali, in particolare igiene delle mani.

TEMPO DI INCUBAZIONE

Il tempo dall'infezione alla comparsa dei sintomi della malattia va da 5 a 50 giorni.

QUADRO CLINICO

Tosse, starnuti **2**, lacrimazione, mal di gola **1**, febbre alta, ingrossamento dei linfonodi **3**, infiammazione del cavo oro-faringeo.

Nei bambini piccoli la patologia è in genere priva di sintomi.

COMPLICAZIONI

Infiammazione dei polmoni, fegato, meningi, coinvolgimento di reni, articolazioni e cuore, anemia.

CONTAGIOSITÀ

Un'affermazione sicura sulla durata della contagiosità non può essere effettuata. Il virus sopravvive in tutte le persone infettate per tutta la vita e viene trasmesso periodicamente tramite la saliva.

RIAMMISSIONE

La riammissione è consentita solo dopo l'attenuazione dei sintomi acuti.

**ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO**

