



1 Dureri în gât



2 Guturai



3 Febră

MONONUCLEOZA INFECȚIOASĂ

MODUL DE INFECTARE

Transmitere prin intermediul picăturilor nazofaringiene: transmitere prin tuse, strănut, vorbit (boala este denumită și „boala sărutului” pentru că transmiterea are loc adesea prin contact bucal).

Infectare prin murdărire sau contact: prin intermediul unor obiecte sau al mâinilor murdare.

PROFILAXIE

Respectarea măsurilor generale de igienă, în special a igienei mâinilor.

TIMP DE INFECTARE

Perioada de la survenirea infectării și până la declanșarea bolii este de 5 până la 50 de zile.

TABLOUL CLINIC

Tuse, guturai **2**, lăcrimare, dureri în gât **1**, febră mare **3**, inflamarea ganglionilor limfatici la gât, inflamații în gât și faringite. La copiii mici, boala evoluează adesea fără simptome.

COMPLICAȚII

Pneumonie, hepatită, meningită, afecțiuni renale, articulare și cardio-vasculare, anemie.

INFECȚIOZITATE

Nu este posibil un enunț sigur cu privire la durata infecțiozității. Virusul supraviețuiește în persoanele infectate pe întreaga durată a vieții acestora și este eliminat periodic prin salivă.

READMITEREA

Readmiterea este posibilă după dispariția simptomelor acute.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
DOCHECK FLEXIKON:**

