




١ حمى



٣ طفح جلدي



٢ صداع

# حصبة ألمانية

## الحمل

**خطر متزايد على الجنين!** اعتلال مضغي بالحصبة الألمانية مع أضرار متعددة وإعاقات شديدة للغاية وغالبًا دائمة للطفل، مثل عيوب القلب الخلقية، أمراض العين وحالات ضعف السمع وأضرار الجهاز العصبي.

## القابلية للإصابة

مدة القابلية للإصابة تكون بالفعل أسبوع واحد قبل بدء ظهور الطفح الجلدي وتمتد حتى أسبوع آخر بعد ظهور الطفح الجلدي.

## التصريح بالعودة

بعد أن تخف حدة أعراض المرض يجوز للطفل المصاب بالحصبة الألمانية معاودة الذهاب إلى حضانة الرعاية اليومية للأطفال كيتا.

## طرق الإصابة

العدوى المنقولة بالراذاز: تنتقل العدوى عند السعال والعطس والحديث.

## الوقاية

تطعيم الحصبة الألمانية (يمكن احتماله بشكل جيد للغاية). التطعيم الأول بين عمر ١١ و ١٤ شهر، التطعيم الثاني بعد ذلك بمدة ٤-٦ أسابيع.

## فترة حضانة المرض

المدة من الإصابة بالعدوى حتى بداية ظهور المرض تستغرق حوالي ١٤ حتى ٢١ يومًا.

## أعراض المرض

حمى ١ ، وصداع ٢ ، وطفح جلدي عابر يبدأ ظهوره في الوجه ٣ ، وتورمات العقد الليمفاوية في نطاق الرقبة، ومشاكل بالمفاصل. غالبًا ما يأخذ المرض مسارًا مماثلًا لعدوى الأنفلونزا، غير أنه يكون عندئذ شديد العدوى.



المزيد من المعلومات على:

