




1 Повышение температуры тела



2 Головная боль



3 Кожная сыпь

КРАСНУХА

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

Воздушно-капельная инфекция: передача при кашле, чихании, разговоре.

ПРОФИЛАКТИКА

Вакцина против краснухи (очень хорошо переносится). Первичная вакцинация между 11-м и 14-м месяцами жизни, вторая вакцинация через 4–6 недель.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

От заражения до начала проявления заболевания проходит от 14 до 21 дня.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Повышение температуры **1**, головная боль **2**, переходящая кожная сыпь на лице **3**, припухание лимфатических узлов в области шеи, боль в суставах. В большинстве случаев болезнь протекает как грипп, но очень заразна.

БЕРЕМЕННОСТЬ

Высокий риск для будущего ребенка!

Синдром врожденной краснухи с множественными травмами и часто остающейся тяжелой инвалидностью у ребенка, например, врожденные пороки сердца, офтальмологические заболевания, нарушения слуха и поражения нервной системы.

ЗАРАЗНОСТЬ

Продолжительность периода заразности уже за одну неделю до появления кожной сыпи и до одной недели после появления кожной сыпи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

После устранения симптомов ребенку, страдающему краснухой, разрешается снова посещать детский сад.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
СПРАВОЧНИКА MSD:**

