



١ طفح جلدي



٣ آلام الحلق



٢ لسان شكل الفراولة

حمى قرمزية

المضاعفات

التهاب الأذن الوسطى والجيوب الأنفية، الالتهاب الرئوي، حُراج في نطاق اللوزتين، تسمم الدم، القيء، الإسهال، حالات النزيف

القابلية للإصابة

تظل القابلية للإصابة بالعدوى قائمة لمدة ٣ أسابيع على الأقل في حالة عدم العلاج بمضاد حيوي، وفي حالة العلاج بمضاد حيوي تصل قابلية الإصابة إلى ٢٤ ساعة.

المضاعفات المتأخرة

أضرار بالقلب والكلى، حمى روماتيزمية، ضرر في نطاق الجهاز العصبي المركزي. **العلاج بالمضاد الحيوي في الوقت المناسب يحد من خطر حدوث هذه الأمراض اللاحقة.**

التصريح بالعودة

الأشخاص المصابون بالحمى القرمزية يجب ألا يذهبوا إلى حضانة الرعاية اليومية للأطفال كيتا. يمكن للأطفال بدءًا من اليوم الثاني بعد بدء العلاج بالمضاد الحيوي وفي ظل تلاشي أعراض المرض معاودة الذهاب إلى حضانة الرعاية اليومية للأطفال كيتا. وفي حالة عدم العلاج لا يُسمح بمعاودة الذهاب للحضانة إلا بعد أن تخف حدة الأعراض، على أقل تقدير بعد ١٤ يومًا.

طرق الإصابة

العدوى المنقولة بالرداذ، تنتقل العدوى عند السعال والعطس والحديث، بل وتنتقل كذلك عن طريق المواد الغذائية أو الأشياء المتسخة.

الوقاية

عند ظهور المرض يجب البدء في العلاج بمضاد حيوي لمنع استمرار انتشار المرض. من المهم الالتزام بإجراءات النظافة الصحية العامة.

أعراض المرض

غثيان وقيء وقشعريرة وحمى شديدة وآلام الزور واحمرار وتورم اللوزتين وكثيرًا ما تنتشر بها نقاط حمراء.

يمكن أن يوجد في سقف الحلق بقع حمراء. في البداية يكون اللسان أبيض سميك، وبعد ذلك يأخذ شكل الفراولة.

بعد ٢-١ يوم يحدث في كثير من الأحيان طفح جلدي على شكل بقع دقيقة ١ يبدأ في الجزء العلوي من الجسم، ثم ينتشر إلى أسفل (تجويف حول الفم، راحتي اليدين وبطني القدمين). يختفي الطفح الجلدي بعد ٦-٩ أيام.

من الممكن أن تظهر الحمى القرمزية في عدة أشكال مرضية. حيث تظهر الحمى القرمزية في أشكال مرضية بسيطة مرورًا بأشكال مرضية بالكاد يتم التعرف عليها وصولًا إلى أشكال مرضية صعبة.



المزيد من المعلومات على:

