



1 Deri döküntüsü



2 Çilek dili



3 Boğaz ağrısı

KIZIL HASTALIĞI

ENFEKSİYON YOLU

Damlacık enfeksiyonu: Öksürük, hapşırma, konuşma yoluyla ve kirli gıda maddeleri veya nesnelere de bulaşabilir.

ÖNLENMESİ

Hastalık kendini gösterdiğinde daha fazla yayılmasını önlemek için antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Genel hijyen önlemlerine uyulması önemlidir.

HASTALIK TABLOSU

Mide bulantısı, kusma, titreme, yüksek ateş, boğaz ağrısı **3**, kızarmış ve çoğu zaman üzerinde sarı renkli yamaların bulunduğu şiş bademcikler. Damakta kırmızı lekeler gözükabilir. Dil, başlarda şiş ve beyaz bir tabaka ile kaplıdır, ardından kırmızı lekeler oluşur **2**. 1-2 gün sonra genelde leke şeklinde deride döküntü **1** başlar. Bu döküntü vücudun üst kısmında başlar ve aşağıya doğru yayılır (ağız çevresi, avuç içleri ve ayak tabanları hariç). Döküntü 6-9 gün sonra kaybolur. Kızıl hastalığına birkaç kez yakalanılabilir. Kızıl hastalığı, neredeyse belli olmayan çok hafif şekilden çok ağır şekillere kadar kendini gösterebilir.

KOMPLİKASYONLAR

Orta kulak ve sinüs iltihabı, zatürre, bademciklerde apse, kan zehirlenmesi, kusma, ishal, kanama

BULAŞICILIK

Hastalık, antibiyotik tedavisine başlanılmadığında en az 3 hafta, antibiyotik tedavisi uygulandığında ise en fazla 24 saat bulaşıcı olma özelliğine sahiptir.

GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

Kalp ve böbreklerde hasar, romatizmal ateş, merkezi sinir sistemi alanında hasar. **Geç kalımdan başlanılan bir antibiyotik tedavisi, ikincil hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltır.**

KREŞE TEKRAR KABUL EDİLME

Kızıl hastalığına yakalanan kişiler kreşe gidemez. Çocuklar, **antibiyotik tedavisinin başlamasından itibaren 2. günde ve herhangi bir hastalık belirtileri görünmez ise tekrar kreşe kabul edilebilirler.** Tedavi uygulanmadığında ise kreşe ancak **belirtilerin kaybolmasından** ve en erken 14 gün sonra başlanılabilir.

AYRINTILI BİLGİ
MEDICALPARK HASTANESİ
SAYFASINDA:

