



١ حمى



٣ طفح جلدي



٢ حكة

جدري الماء

الحمل

الحمل: مسار خطير للمرض إذا كانت السيدة الحامل لم يتم تطعيمها أو لم يسبق لها الإصابة بجذري الماء. في شهور الحمل الأولى يمكن أن تحدث تشوهات بالجنين أو إجهاضي. في حالة الإصابة بالمرض قبيل الولادة أو بعد الولادة مباشرة يمكن أن يُصاب المولود بمرض جذري الماء والذي يُعد مهددًا لحياته.

القابلية للإصابة

مدة القابلية للإصابة تبدأ من ٢-١ يومًا قبل ظهور الفقاعات وتنتهي بعد حوالي ٧ أيام.

التصريح بالعودة

يختص الطبيب بقرار التصريح بالعودة. لا يجوز للأشخاص المحتمكين بالمرض الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين تم تطعيمهم لمرة واحدة الذهاب إلى حضنة الرعاية اليومية للأطفال لمدة ١٦ يومًا.

طرق الإصابة

ما يُسمى "العدوى المتطايرة". الفيروسات شديدة العدوى يمكن أن تنتقل عن طريق تيارات الهواء لمسافة عدة أمتار.

الوقاية

تطعيم جذري الماء. التطعيم الأول بين عمر ١١ و ١٤ شهر. التطعيم الثاني بعد ذلك بمدة ٦-٤ أسابيع على الأقل.

فترة حضنة المرض

المدة من الإصابة بالعدوى حتى بداية ظهور المرض تستغرق حوالي ٨-٢٨ يومًا. وفي معظم الأحوال ١٦-٤ يومًا.

أعراض المرض

حمى خفيفة ١ وأعراض نزلة برد. ظهور على شكل دفعات للفقاعات المملوءة بالسائل على كامل الجسم ٢. يتباين مسار المرض في درجة شدته.

المضاعفات

بوجه عام: نادرًا ما تكون هناك مضاعفات مصحوبة بالتهاب رئوي أو ميل إلى النزيف أو إصابة الجهاز العصبي المركزي. مسار خطير للمرض مع الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة أو أمراض جلدية خطيرة (مثل الالتهاب الجلدي العصبي).



المزيد من المعلومات على:

