



1

Febbre



2

Prurito



3

Eruzione cutanea

# VARICELLA

## CONTAGIO

Cosiddetta "infezione volante". I virus altamente contagiosi possono essere trasmessi per via aerea anche su una distanza di diversi metri.

## PREVENZIONE

Vaccino contro la varicella. Prima vaccinazione tra l'11° e il 14° mese di vita. Richiamo almeno 4–6 settimane dopo.

## PERIODO DI INCUBAZIONE

Dal contagio fino alla comparsa dei sintomi della malattia decorrono circa 8–28 giorni, in genere 14–16 giorni.

## QUADRO CLINICO

Febbre leggera <sup>1</sup> e sintomi influenzali. Comparsa intermittente di vescicole piene di liquido su tutto il corpo <sup>2</sup>. Decorso della malattia di diversa gravità.

## COMPLICAZIONI

In generale: complicazioni piuttosto rare con infiammazione polmonare, tendenza al sanguinamento o coinvolgimento del sistema nervoso centrale.

**Decorso grave in soggetti immunodepressi o con gravi patologie cutanee (ad esempio neurodermite).**

## GRAVIDANZA

Gravidanza: **pericolose conseguenze se la donna in gravidanza viene contagiata o se non ha mai contratto la varicella.**

Nelle prime settimane di gravidanza può causare malformazioni del feto o aborto spontaneo. In caso di contrazione della malattia poco prima del parto o appena dopo la nascita, il neonato può manifestare la varicella con potenziale pericolo di vita.

## CONTAGIOSITÀ

La contagiosità inizia 1–2 giorni prima della comparsa delle vesciche e termina dopo circa 7 giorni.

## RIAMMISSIONE

**La riammissione è decisa dal medico.** Le persone a contatto non vaccinate o vaccinate solo una volta non possono frequentare la scuola dell'infanzia per 16 giorni.

ULTERIORI INFORMAZIONI  
SUL SITO

