



1

Febră



2

Prurit



3

Erupție cutanată

VARICELĂ (VĂRSAT DE VÂNT)

MODUL DE INFECTARE

Este așa-numită „infecție zburătoare”. Virusurile extrem de contagioase pot fi transmise pe calea aerului la o distanță de mai mulți metri.

PROFILAXIE

Vaccin anti-varicelă. Prima vaccinare se efectuează între a 11-a și a 14-a lună de viață. A doua vaccinare se efectuează după cel puțin 4-6 săptămâni.

PERIOADA DE INCUBAȚIE

De la contagiune și până la declanșarea bolii trec aproximativ 8-28 de zile, dar de cele mai multe ori trec 14-16 zile.

TABLOUL CLINIC

Febră ușoară **1** și simptome de răceală. Apariția în etape, pe întregul corp, a unor vezicule umplute cu lichid **2**. Evoluție diferit de gravă a bolii.

COMPLICAȚII

În general: apar destul de rar complicații cu pneumonie, tendințe de hemoragie sau afectarea sistemului nervos central.

Există o evoluție severă în cazul persoanelor cu imunodeficiență sau boli grave ale pielii (de ex. neurodermită).

GRAVIDITATE

Graviditate: **există o evoluție periculoasă în cazul în care gravida nu este vaccinată sau dacă nu a avut varicelă.** În perioada de început a sarcinii se pot produce malformații ale fătului sau poate interveni un avort spontan. În cazul unei îmbolnăviri cu puțin timp înainte de naștere sau imediat după aceea, în cazul nou-născutului poate interveni o îmbolnăvire cu varicelă, care să îi pună viața în pericol.

INFECȚIOZITATE

Durata de infecțiozitate începe cu 1-2 zile înainte de apariția veziculelor și se încheie după aproximativ 7 zile.

READMITEREA

Medicul decide cu privire la readmiterea în colectivitate. Persoanele de contact nevaccinate sau vaccinate doar o dată nu au voie să frecventeze grădinița cu program prelungit pe o perioadă de 16 zile.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE
PE PAGINA
INSTITUTULUI ROBERT KOCH:**

