



1

Ateş



2

Kaşıntı



3

Deri döküntüsü

SUÇIÇEĞİ

ENFEKSİYON YOLU

“Uçan enfeksiyon” da denir. İleri derecede bulaşıcı olan virüsler, havanın cereyan yapması ile birkaç metre mesafeye kadar bulaşabilir.

ÖNLENMESİ

Suçiçeği aşısı. İlk aşı 11 ila 14 aylıkken yapılmalıdır. İkinci aşı ise bundan en az 4–6 hafta sonra yapılmalıdır.

KULUÇKA SÜRESİ

Hastalığın bulaşmasından meydana çıkmasına kadar yaklaşık 8–28 gün geçer, genelde bu süre 14–16 gündür.

HASTALIK TABLOSU

Hafif ateş ¹ ve soğuk algınlığı belirtileri. Vücudun tamamında, parti parti olmak üzere içi sıvı ile dolu kabarcıklar oluşur ². Hastalık seyrinin ağırlığı, kişiden kişiye farklı olabilir.

KOMPLİKASYONLAR

Genel: Nadir durumlarda zatürre, kanamaya eğilim gibi veya merkezi sinir sisteminin eşlik ettiği komplikasyonlar meydana gelir.

Bağışıklığı zayıf veya ağır cilt hastalıkları (örn. nevrodermit) olan kişilerde hastalık, ağır bir şekilde seyredir.

GEBELİK

Gebelik: **Gebe kişi aşıllı değil ise veya kendisi de henüz suçiçeği geçirmemiş ise hastalığın seyri tehlikelidir.** Erken gebelik döneminde doğmamış bebekte sakatlığa veya düşük yapılmasına neden olabilir. Doğumdan kısa bir süre öncesinde veya doğumdan kısa bir süre sonra hastalığın yaşanması durumunda yeni doğan bebekte hayati tehlike oluşturan bir suçiçeği hastalığı yaşanabilir.

BULAŞICILIK

Hastalık, kabarcıkların meydana gelmesinin 1–2 gün öncesinden kabarcıkların başlamasından itibaren yaklaşık 7 gün bulaşıcıdır.

KREŞE TEKRAR KABUL EDİLME

Çocuğun ne zaman kreşe gidebileceğine doktor karar verir.

Hasta kişiler ile temas eden aşı olmamış ya da sadece bir kez aşı olmuş kişiler 16 gün boyunca kreşe gidemezler.

AYRINTILI BİLGİ T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINDA:

